

2019 年 7 月 3 日演習問題解答

I 関数

$$f(t) = \log(1+t)$$

に対して $t = 0$ において Taylor の定理を $n = 4$ で適用しましょう。

(解答)

$$f'(t) = \frac{1}{1+t}, \quad f''(t) = -\frac{1}{(1+t)^2}, \quad f^{(3)}(t) = \frac{2}{(1+t)^3}, \quad f^{(4)}(t) = -\frac{3!}{(1+t)^4},$$

から

$$f(0) = \log 1 = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = -1, \quad f^{(3)}(0) = 2$$

となります。4 階の Taylor の定理から $t \neq 0$ のとき

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{1}{2}f''(0)t^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)t^3 + \frac{1}{4!}f^{(4)}(c)t^4$$

すなわち

$$\log(1+t) = t - \frac{1}{2} \cdot t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+c)^4}t^4$$

を満たす c が 0 と t の間に存在する。

II 関数

$$f(t) = \frac{1}{1+t}$$

に対して $t = 0$ において Taylor の定理を $n = 4$ で適用しましょう。

(解答)

$$f'(t) = -\frac{1}{(1+t)^2}, \quad f''(t) = \frac{2}{(1+t)^3}, \quad f^{(3)}(t) = -\frac{3!}{(1+t)^4}, \quad f^{(4)}(t) = \frac{4!}{(1+t)^5},$$

から

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = -1, \quad f''(0) = 2, \quad f^{(3)}(0) = -3!$$

を得るので、4 階の Taylor の定理から $t \neq 0$ のとき

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{1}{2}f''(0)t^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)t^3 + \frac{1}{4!}f^{(4)}(c)t^4$$

すなわち

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \frac{1}{(1+c)^5}t^4$$

を満たす c が 0 と t の間に存在する。

III 関数 $f(t) = te^t$ に対して高次の導関数 $f^{(n)}(t)$ を求めましょう。

(解答)

$$f'(t) = 1 \cdot e^t + t \cdot e^t = (t+1)e^t, \quad f''(t) = 1 \cdot e^t + (t+1) \cdot e^t = (t+2)e^t,$$
$$f^{(3)}(t) = 1 \cdot e^t + (t+2) \cdot e^t = (t+3)e^t$$

から

$$f^{(n)}(t) = (t+n)e^t \quad (15)$$

と推測できる。実際 (15) を微分して

$$f^{(n+1)} = 1 \cdot e^t + (t+n) \cdot e^t = (t+n+1)e^t$$

と (15) の n を $n+1$ にずらした結果となるので、数学的帰納法によって (15) がすべての $n \in \mathbb{N}$ に対して成立することが示された。

IV Taylor の定理を用いて不等式

$$e^t > 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 \quad (t \neq 0)$$

を示しましょう。

(解答)

$$f'(t) = f''(t) = f^{(3)}(t) = f^{(4)}(t) = e^t$$

から

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = f^{(3)}(0) = 1$$

が分かる。4 階の Taylor の定理より $t \neq 0$ のとき

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{f''(0)}{2}t^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}t^3 + \frac{f^{(4)}(c)}{4!}t^4$$

すなわち

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}e^ct^4$$

を満たす c が 0 と t の間に存在する。ここで $t \neq 0$ であることから、4 階の剰余項について

$$\frac{1}{4!}e^ct^4 > 0$$

であることが従うので

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}e^ct^4 > 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3$$

が成立する。

V(1) $f(t) = \sqrt{1+t}$ に対して $f'(t)$ 、 $f''(t)$ 、 $f^{(3)}(t)$ を求めましょう。

(2) $t > 0$ のとき不等式

$$1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 < \sqrt{1+t} < 1 + \frac{1}{2}t$$

が成立することを示しましょう。ただし Taylor の定理を用いましょう。

(解答) (1)

$$\begin{aligned}f'(t) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t}} \\f''(t) &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{(1+t)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+t)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+t)\sqrt{1+t}} \\f^{(3)}(t) &= -\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) \frac{1}{(1+t)^{\frac{5}{2}}} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{(1+t)^2\sqrt{1+t}}\end{aligned}$$

(2) (1) を用いると

$$f(0) = 1, f'(0) = \frac{1}{2}, f''(0) = -\frac{1}{4}$$

が成立します。2階の Taylor の定理を用いると

$$\begin{aligned}\sqrt{1+t} &= f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{1}{2}f''(c_1)t^2 \\&= 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{(1+c_1)\sqrt{1+c_1}} \cdot t^2\end{aligned}$$

を満たす c_1 が存在して $0 < c_1 < t$ を満たします。ここで

$$-\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{(1+c_1)\sqrt{1+c_1}} \cdot t^2 < 0$$

から

$$\sqrt{1+t} < 1 + \frac{1}{2}t$$

が従います。他方、3階の Taylor の定理を用いると

$$\begin{aligned}\sqrt{1+t} &= f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{1}{2}f''(0)t^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(c_2)t^3 \\&= 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8} \cdot t^2 + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{(1+c_2)^2\sqrt{1+c_2}} \cdot t^3\end{aligned}$$

を満たす c_2 が存在して $0 < c_2 < t$ を満たします。このとき

$$\frac{1}{16} \cdot \frac{1}{(1+c_2)^2\sqrt{1+c_2}} \cdot t^3 > 0$$

から

$$\sqrt{1+t} > 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2$$

が従います。

VI 不等式

$$t - \frac{t^2}{2} < \log(1+t) < t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!} \quad (\textcolor{red}{t > 0})$$

を示しましょう。

(解答) $f(t) = \log(1+t)$ とすると

$$f'(t) = \frac{1}{t+1}, f''(t) = -\frac{1}{(t+1)^2}, f^{(3)}(t) = \frac{2}{(t+1)^3}, f^{(4)}(t) = -\frac{3!}{(t+1)^3}$$

から

$$f(0) = \log 1 = 0, f'(0) = 1, f''(0) = -1, f^{(3)}(0) = 2,$$

となる. f に $t=0$ における 3 階の Taylor の定理を適用すると

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{1}{2}f''(0)t^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(c_1)t^3$$

すなわち

$$\begin{aligned} \log(1+t) &= t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3!} \cdot \frac{2}{(1+c_1)^3}t^3 \\ &= t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(1+c_1)^3}t^3 \end{aligned}$$

を満たす c_1 が 0 と t の間に存在します. いま $t > 0$ の場合を考えていますから

$$0 < c_1 < t$$

となることに注意しましょう. このとき $1+c_1 > 0, t^3 > 0$ であることから 3 階の剩余項は

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(1+c_1)^3}t^3 > 0$$

と評価されます. 従って

$$\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(1+c)^3}t^3 > t - \frac{1}{2}t^2$$

が成立することが分かる.

他方 $t=0$ における 4 階の Taylor の定理を適用すると

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + \frac{1}{2}f''(0)t^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)t^3 + \frac{1}{4!}f^{(4)}(c_2)t^4$$

すなわち

$$\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3!} \cdot 2t^2 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3!}{(1+c_2)^4}t^3 = t - \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+c_2)^3}t^4$$

を満たす c_2 が 0 と t の間に存在します. いま $t > 0$ の場合を考えていますから $0 < c_2 < t$ となることに注意しましょう. このとき $1+c_2 > 0, t^4 > 0$ であることから 4 階の剩余項は

$$-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+c_2)^3}t^4 < 0$$

と評価されます (実は、この評価には $t > 0$ を使いません)^{*2}. 従って

$$\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1+c_2)^4}t^4 < t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3$$

が成立することが分かる.

^{*2} $-1 < t < 0$ の場合は $-1 < t < c_2 < 0$ となりますから、 $1+c_2 > 0$ であることが分かります.